

Nichoir à martre

Outil qui peut servir à augmenter la population de
martres

Qualité de l'habitat de la martre

☒ 10% de forêt mature, mixte et d'un seul tenant, 30 % de forêt de 7 mètres et plus mixte. Le reste composé de différents étages de forêt en repousse et de différentes tiges favorisant la population de lièvres.

☒ Dans la forêt mixte mature, il faut retrouver 1= des débris au sol 2= il faut que sa canopée soit dense et composée surtout de conifères. Dans sa bordure, il faut retrouver des chicots. Il faut aussi que ces différentes forêts soient reliées par des corridors de dispersion d'un minimum de 100 pieds de largeur.

NICHOIR À MARTRES

INSTALLÉ EN 2009



SA LOCALISATION

1. 15 à 20 pieds de hauteur
2. Dans la bordure de transition entre la forêt mature et celle de 7 mètres
3. Dans un arbre feuillu, afin que le soleil réchauffe le nid le plus possible
4. FACE AU SUD, TRÈS IMPORTANT
5. Près d'un ruisseau où l'on retrouve beaucoup de petits arbustes (une bonne frange d'aulnes)
6. Un minimum de 1 km entre chaque nid (pour éviter la compétition entre les mères)

Fabrication du nichoir

- ☒ Bois brut sans peinture, colle, ciment ou fibre de verre. Idéal : vieille planche grise
- ☒ Couvercle sur le dessus retenu par des fils de fer et anneaux sur le côté
- ☒ Largeur : 6 pouces, soit 15.5 cm
- ☒ Profondeur : 6 pouces, soit 15.5 cm
- ☒ Hauteur : 14 à 16 pouces, soit 35 à 40 cm
- ☒ Trou : 2 pouces (5 cm) de diamètre maximum

ACTIONS POUVANT AIDER LA MARTRE

- ❑ 1. TARD EN AUTOMNE, ATTACHER UNE CARCASSE DE CASTOR DANS LES 50 PIEDS DU NICOIR, À UNE HAUTEUR DE 15 PIEDS.
- ❑ Dans les 100 pieds autour du nichoir, étendre une bonne épaisseur de paille, ce qui favorisera l'établissement d'une bonne population de souris, campagnols et mulots.
- ❑ Déposer vos carcasses de perdrix dans l'environnement du nichoir. Ceci favorisera la matière dont la martre a besoin afin d'isoler son nid.

ATTENTIONS SPÉCIALES

- ❖ Vider les nichoirs seulement en août
- ❖ Ne pas déranger la martre qui élève ses petits
- ❖ Faire le piégeage du lynx et du pékan, qui sont les prédateurs de la martre
- ❖ Faire le piégeage de la martre seulement après la deuxième année
- ❖ Faire les installations de trappage à plus de 0.5 km du nichoir
- ❖ Ne trapper que les juvéniles au mois de novembre (phénomène de dispersion)

LE NICHOIR À MARTRE

 DOCUMENT
PRODUIT PAR

 GAÉTAN GAUTHIER